

PŘÍLOHA – Fotografie vybraných invazních druhů




Jelen sika (*Cervus nippon*), původem z východní Asie, se kříží s naším původním jelenem evropským (*Cervus elaphus*). Foto: [Lilly M, CC BY-SA 3.0](#)

PŘÍLOHA – Fotografie vybraných invazních druhů



Nutrie říční (*Myocastor coypu*), původem z Jižní Ameriky, u nás byla chována na kožešiny a maso. Jedinci uprchlí z farem založili divoké populace, jejichž velikost v posledních letech prudce roste. Foto: Pavel Pipek, Botanický ústav AV ČR

PŘÍLOHA – Fotografie vybraných invazních druhů



Sršeň asijská (*Vespa velutina*) se šíří Evropou ze západní Francie, kam byla zavlečena z východní Asie. Napadá včelstva a ve srovnání s původní sršní obecnou je agresivnější i vůči lidem. Nejbližší pozorování je z hranic Maďarska, Slovenska a Rakouska. Foto: [Gilles San Martin, CC BY-SA 2.0](#)



Pajasan žláznatý (*Ailanthus altissima*) je problematický strom, který se v současnosti šíří teplými oblastmi Česka, zejména podél silnic a železnic. Je to druh, u kterého je důležité nastavit správné metody likvidace, jinak dojde ke zhoršení stavu. Foto: Jan Pergl, Botanický ústav AV ČR

PŘÍLOHA – Fotografie vybraných invazních druhů



Rak mramorovaný (*Procambarus virginalis*) je nebezpečný hlavně tím, že se rozmnožuje nepohlavně, takže k založení populace stačí jeden vypuštěný jedinec. Stejně jako ostatní severoameričtí raci přenáší račí mor, který hubí naše raky. Foto: Frank Lyko, CC-BY-3.0.



Bolševník velkolepý (*Heracleum mantegazzianum*) původem z Kavkazu může dosahovat až pěti metrů. Jeho šťávy jsou fototoxické, tj. v kombinaci se slunečním svitem způsobují na kůži poleptání a puchýře. Foto: Kateřina Štajerová, Botanický ústav AV ČR